

SINIKETTUJEN KUNTOLUOKITUS



1. Erittäin laiha

Yleisvaikutelma eläimestä on laiha. Kylkiluut tuntuvat helposti eikä niiden päällä ole käsin tuntuva rasvakerrosta. Lavan ja lantion luut erottuvat selvästi ja olemus on luinen. Lievää lihasten surkastumista. Vatsalinja vetäytyy ylös.



2. Laiha

Yleisvaikutelma eläimestä on hoikka. Kylkiluut, lavat ja lantio tuntuvat helposti ja niiden päällä on ohut rasvakerros. Vatsalinja vetäytyy ylös.



3. Normaali

Yleisvaikutelma eläimestä on sopusuhtainen. Kylkiluut, lavat ja lantio tuntuvat helposti selvän rasvakerroksen alta. Vatsalinja on suora.



4. Lihava

Yleisvaikutelma eläimestä on lihava. Kylkiluita on vaikea tunkea rasvakerroksen alta. Lapojen ja lantion alueella on selvä rasvakerros. Vyötärön seutu on pyöristynyt ja vatsassa selvä rasvakerros.



5. Erittäin lihava

Yleisvaikutelma eläimestä on erittäin lihava ja rasvakudos muodostaa "rasvamakkaroita". Kylkiluut eivät tunnu paksun rasvakerroksen alta. Vatsan alue on pullistunut. Lapojen ja lantion alueella on paksu rasvakerros. Selvä rasvakerros myös jaloissa ja naamassa.

Kuntoluokituksessa arvioidaan

eläimen ihonalaisen

rasvakerroksen paksuutta.

Sopivan kuntoluokan

saavuttaminen ja säilyttäminen

eri kasvu-, lisääntymis- ja

tuotantokausina on tärkeää

eläimen terveyden sekä tuotanto-

ja lisääntymiskyvyn, erityisesti

pentutuloksen, kannalta.


Eläimen kuntoluokka arvioituna asteikolla 1-5, erittäin laiha (1) erittäin lihavaan (5).

KUNTOLUOKITUSTA TARVITAAN OHJAAMAAN

- 1) pentuna siitokseen valittujen nuorten naaraiden ruokintaa ja kunnostusta ensimmäiseen siitoskauteen,
- 2) myöhään syksyllä siitokseen valittujen lihaviin naaraiden laihdutusruokintaa,
- 3) vanhojen siitoseläinten ruokintaa ja kuntoa ympäri vuoden,
- 4) tuotantoeläinten ruokintaa ja kuntoa niin, että liikalihavuus saadaan hallintaan.

Merkitse kuntoluokka Sampoon Lisätieto-kenttään.

Kuvio 1. Suositus päivittäisen rehuannoksen koosta g/vrk nuorille siitokseen alkusyksystä valituille sinikettunaaraille, kun rehun energiakoostumus on STKL ry:n suositusten mukainen (1700 kcal/kg) tai ± 100 kcal.



Kuvio 2. Suositus päivittäisen rehuannoksen koosta g/vrk nuorille siitokseen alkusyksystä valituille sinikettunaaraille, kun rehun energiakoostumus on STKL ry:n suositusten mukainen (1200 kcal/kg) tai ± 100 kcal ja kun eläimet ruokittu syyskaudella rajoitetusti.

