



Kuva: Luke/Kati Rikala

Yleisölle avoin tutustumispäivä pidettiin Lantonsuon turvetuotantoalueen koekentällä, Lapinlahdella 9.9.2026.

Esittelyssä oli turvetuotantoalueen jälkikäytön erilaisia vaihtoehtoja mm. lyhytkiertoviljelyn kasvillisuusruutuja, aurinkopaneelirakenteita ja niiden aluskasvillisuutta.

Lisäksi esiteltiin alustavia tuloksia jälkikäytön ilmastovaikutuksista ja aurinkopaneelin sähköntuoton kannattavuudesta sekä demonstroitiin kasvihuonekaasumittauksen tekoa aidoilla kaasunmittauslaitteilla.

Kuituhamppuruudut

Neljä kerrannetta, ruutu 6x6 m, josta koealaa 4x4 m

Kuivasato 2026: ei biohiilikäsittelyssä 2044 kg/ha ja biohiilikäsittelyssä 1691 kg/ha, ei tilastollisesti merkitsevää eroa käsittelyissä

Vuosi 2025

Kylvömäärä: 40 kg/ha

Lannoitus: 550 kg/ha Hevi 1

Kalkitus: 20 tn /ha

Biohiili: lisätty 100 m³/ha toiseen puoliskoon ruutua

Vuosi 2026

Kylvömäärä: 185 kg/ha (n. 4,6 x siemenen huonon itävyyden vuoksi)

Lannoitus: 750 kg/ha Hevi 1 (korjasi P ja K puutetta, kustannuksia ei huomioitu)



Kuva: Luke/Juhani Salonen

Kuituhamppukasvusto vuonna 2026. Hamppu kylvettiin joka vuosi uudelleen.

Ruokohelpiruudut

Neljä kerrannetta, ruutu 6x6 m, josta koealaa 4x4 m

Kuivasato 2026: ei biohiilikäsittelyssä 2765 kg/ha ja biohiilikäsittelyssä 2584 kg/ha, ei tilastollisesti merkitsevää eroa käsittelyissä

Vuosi 2025

Kylvömäärä: 16 kg/ha

Lannoitus: 550 kg/ha Hevi 1

Kalkitus: 20 tn /ha

Biohiili: lisätty 100 m³/ha toiseen puoliskoon ruutua

Vuosi 2026

Ei uusintakylvöä

Lannoitus: 750 kg/ha Hevi 1

(korjasi P ja K puutetta, kustannuksia ei huomioitu)



Kuva: Luke/Juhani Salonen

Ruokohelpikasvusto vuonna 2026

Kontrolliruutu

Neljä kerrannetta, Ruutu 6x6 m, josta
koealaa 4x4 m

Vuosi 2025

Luontainen kasvillisuus, ei kylvöjä
Biohiili 100 m³/ha lisättiin toiseen
puoliskoon ruutua
Lannoitteena tuhka Ecolan T4000, 3000
kg/ha

Vuosi 2026

Ei toimenpiteitä, ei sadonkorjuuta



Kuva: Luke/Minna Kivimäenpää

Kontrolliruuduissa biohiili näkyy vielä tummempana kerroksena
maan pinnalla. Biohiili kuvassa vasemmalla puoliskolla ruutua.



Kuva: Luke/Kati Rikala

Aurinkopaneelien alla kasvoi erilaisia kukkivia, matalia luonnonkasviseoksia. Kukkivat kasvit ovat pölyttäjäille tärkeitä ravinnonlähteitä muuten karussa ympäristössä. Kasviseoksiin valittiin matalia kasveja, sillä aurinkopaneelien alla on kohonnut paloriski. Koeruutu kuvattu syksyllä 2026.

Siemenseokset:

Seos 1: valkoapila, jäykkänata, harakankello, nurmikhokki, päivänkakkara

Seos 2: rehuvirna, jäykkänata, puna-ailakki, särmäkuisma, ruusuruoho

Seos 3: valkoapila, jäykkänata

Kontrolli: ei kylvöä, luontainen kasvillisuus

- Kylvömäärä 14 kg/ha
- Ruudun koko 0,9 m x 5,76 m
- Lannoitteena kaikissa ruuduissa tuhka Ecolan T4000, 3000 kg/ha

Aurinkosuo Koealuekartta

Selitteet:

- 1_CTRL = luontainen
- 2_Ha = kuituhamppu
- 3_RH = ruokohelpi
- 4_AV = aurinkovoima
- Paneelit
- Biohiili:



Euroopan unionin
osarahoittama



Elinvoimakeskus



Pienruutukoe

Pienruutukokeen tarkoituksena oli tutkia eri siemenseoksien itävyyttä ja kasvua sekä tuhkalannoituksen vaikutusta niihin.

Vuosi 2025

Kylvömäärä: 14 kg/ha, samat kasviseokset kuin aurinkopaneelien alla

Kontrolli: luontainen kasvillisuus, ei kylvöä

Lannoitus: osa pienruuduista sai tuhkaa, Ecolan T4000, 3000 kg/ha, osa ei saanut mitään lannoitusta

Vuosi 2026

Ei toimenpiteitä



Tuhkaa saaneet koeruudut erottuvat vuonna 2026 selvästi runsaammalla kasvillisuudella lannoittamattomista ruuduista.

Pienruutujen koejärjestelyt

1. S1	5. K ei lannoitusta	9. S1 ei lannoitusta	13. S3 ei lannoitusta
2. S3	6. K ei lannoitusta	10. K	14. S3
3. S2	7. S2 ei lannoitusta	11. S1	15. K
4. S1 ei lannoitusta	8. S2	12. S3 ei lannoitusta	16. S2 ei lannoitusta

Siemenseokset pienruuduissa samat kuin aurinkopaneelien alla:

Seos 1 (S1): valkoapila, jäykkänäta, harakankello, nurmikohokki, päivänkakkara

Seos 2 (S2): rehuvirna, jäykkänäta, puna-ailakki, särmäkuisma, ruusuruoho

Seos 3 (S3): valkoapila, jäykkänäta

Kontrolli (K): ei kylvöä, luontainen kasvillisuus

Ruudun koko 1 m x 1 m

Vihreä ruutu: tuhkalannoitus annettu

Punainen ruutu: ei lannoitusta



**Euroopan unionin
osarahoittama**



Elinvoimakeskus





Tilaisuuden aikana päästiin kuulemaan ensimmäisiä laskelmia aurinkopaneelien laskennallisesta kannattavuudesta. Lisäksi tutustuttiin sähköntuottoa koekentällä mittaavaan aurinkopaneeliyksikköön.


Yleisö pääsi tutustumaan myös tuhkalannoituksen vaikutusta havainnollistaviin pienruutukokeisiin.

Kuvat: Luke/Kati Rikala

Aurinkovoiman ja biomassan tehokkuus energiantuotannossa

Mallinnuksessa aurinkosähkön energiantuotto on selvästi puubiomassan energiasisältöä suurempi

© Luke



~27x

Aurinkovoima vs. hieskoivu

~14x

Aurinkovoima vs. runsastuottoinen paju
kivennäismaapellolla

Tulkinta

Kun tarkastellaan vain pinta-alaa ja energia-määrää, aurinkosähkö on selvästi tehokkain. Kokonaiskestävyyteen vaikuttavat kuitenkin myös ilmasto-, luonto- ja talousvaikutukset.

0,3 ha

0,15 ha


0,01 ha (100 m²)

← Jalanjälki pienen talon lämmitykselle ~9 000 kWh/vuosi

Aurinkovoiman tuotantoarvon simulointi

- PVGIS ERA5 aurinkovoiman tuotantomalli Varpaisjärven kohteelle – tuotanto (2005-2023 ka) ja sähkön pörssihinta (2023/1-2025/9) määritelty tunneittain
- Tuotanto on voimakkaasti keskittynyt kevät- ja kesäpäiville.


-> Tuotetun sähkön arvo jää heikoksi, kun korkea tarjonta laskee sähkön hintaa tuotantohuippuina.




Euroopan unionin
osarahoittama

Aurinkovoiman (1 kWp) tuotanto vuorokauden ajan ja kuukausittain Varpaisjärvellä (2005-2023 PVGIS)

Vuosituotos: 852 kWh



Aurinkovoiman tuotantokustannus ja tuotannolla saatava markkina-arvo



38 €/kWp/vuosi

Mallinnettu aurinkovoiman vuosittainen kassavirta

-1.4% sisäinen korko

Investoinnin tuotto asetettujen oletusten vallitessa

Tulkinnassa huomioitava

Laskelma ei huomio ympäristöhyötyjä eikä puhtaan energian tukia


CAPEX on 720 €/kWp (IRENA 2025). Se voi olla yläkanttiin kustannustehokkuuden kehittyessä. Toisaalta herkkyys-analyyssissä alhaisin käytetty 540 €/kWp CAPEX (LCOE 7%) oli vielä kannattamaton.



Euroopan unionin
osarahoittama



Alustavia tuloksia maaperän kasvihuonekaasuista

CO₂-vuo maasta



Aikasarja maaperän heterotrofisista CO₂- voista (R_{het}) vuodelta 2025. R_{het} mitattiin ”trentsatuilta” mittauspisteiltä ja se sisältää turpeen hajoamisesta aiheutuvan CO₂-vuon. Aikasarjasta nähdään, että CO₂-vuo oli alhaisin paneelin alla.

Kasvukaudenaikainen maan lämpötila




Kasvukaudenaikainen CO₂ – vuo laskettiin CO₂-tuotannon lämpötila-riippuvuuden avulla (Lloyd & Taylor 1994)

Lloyd & Taylor. 1994. “On the Temperature Dependence of Soil Respiration.” *Func. Ecol* 8: 315–23.

Maaperän lämpötilaa mitattiin loggereilla jatkuvatoimisesti koko kasvukauden ajan.

Alustavia tuloksia maaperän kasvihuonekaasuista


CH₄-vuo maasta




Maaperän CH₄-vuot mitattiin mittauspisteistä, jossa maa ja kasvillisuus ovat koskemattomia. Kasvukaudenaikainen CH₄ vuo laskettiin mittausten keskiarvoina, sillä CH₄ ja lämpötilan välillä ei ollut riippuvuutta.

Kasvukaudenaikaiset CO₂- ja CH₄-vuot ovat pienemmät aurinkopaneelin alla, mahdollisesti johtuen pienemmästä maan lämpötilasta ja kosteudesta. CH₄:n rooli on pieni kokonaishiilivuossa.


Kasvukaudenaikainen CO₂-vuo vuonna 2025



Kasvukaudenaikainen CH₄-vuo vuonna 2025



Kokonaishiilivuo vuonna 2025



Lisätietoja:
<https://www.luke.fi/fi/projektit/aurinkosuo>



luke.fi



**Euroopan unionin
osarahoittama**



Elinvoimakeskus

© Luonnonvarakeskus
© Natural Resources Institute Finland
© Naturresursinstitutet