


Neuvonnalliset fungisidikokeet 2024

Marja Jalli





Ilmajoen ohrakoe


- Kylvö 30.5.2024
- Lajike Bredo-ohra




Ilmajoen sää



Cumulative precipitation in Ilmajoki in
May-August 2024 and 1981-2010



Daily precipitation in Ilmajoki in
May-August 2024



Keskilämpötila

2024	1991-2020	Poikkeama
C	C	C

Sademäärä


2024	1991-2020	Suhdeluku
mm	mm	

Toukokuu	13,0	9,1	3,9	10	43	23 %
Kesäkuu	15,7	13,8	1,9	79	55	144 %
Heinäkuu	17,5	16,3	1,2	258	75	344 %
Elokuu	16,8	14,3	2,5	206	67	307 %

Ruiskutukset 24.6. BBCH 30-31 ja 2.7. BBCH 37-39




WisuEnnuste Ilmajoki




- Kohtalainen riski täyttynyt 10.7.
- Suuri riski täyttynyt 18.7. – kasvuaste > 60, ei ruiskutettu

Rengaslaikku 15 pv A ja 7 pv B



Rengaslaikku 30 pv A ja 22 pv B




Puinti 28.8.




Kuvat: Janne Heikkinen


Sato kg/ha



Sato kg/ha




Sato kg/ha valmisteilla, joilla sekä A- että B-käsittely (C=kontrolli)




HLP

© Luke



Luke

TJP



Luke

Huomioita kokeesta

- Ilmajoen ohrakasvuston alkuunlähtö oli tasainen. Kesäkuun alun sateet kellastuttivat osin kasvustoa, mikä on saattanut aiheuttaa virhelähdettä sadonmuodostukseen
- Kasvitaudeista rengaslaikun lisäksi esiintyi vähäisiä määriä ohran tyvi- ja lehtilaikkua.
- Kasvusto pysyi kohtuullisesti pystyssä voimakkaista sateista huolimatta.
- Rengaslaikun määrä todennäköisesti lisääntyi jonkun verran viimeisestä havaintokerrasta.
- Rengaslaikku esiintyi kasvustossa laikkuina, joka aiheuttaa vaihtelua tuloksiin.