

KONDITIONS KLASSIFICERING AV BLÅRÄV



1. Ytterst mager

Det allmänna intrycket är att djuret är magert. Revbenen känns tydligt och man märker inget fett på dem. Man känner tydligt benen på bogen och höfterna och djuret verkar benigt. Musklerna är lätt förtvinade. Magen är indragen.



2. Mager

Det allmänna intrycket är att djuret är slinkt. Revbenen, bogen och höfterna känns tydligt och har ett tunt fettlager. Magen är indragen.



3. Normal

Det allmänna intrycket är att djuret är proportionerligt. Revbenen, bogen och höfterna känns tydligt under ett klart fettlager. Bukens linje är rak.



4. Fet

Det allmänna intrycket är att djuret är fett. Det är svårt att känna revbenen under fettlagret. Ett klart fettlager täcker området kring bogen och höfterna. Midjan är rund och buken har ett tydligt fettlager.



5. Mycket fet

Det allmänna intrycket är att djuret är mycket fett, och fettvävnaden bildar valkar. Revbenen känns inte under det tjocka fettlagret. Hela buken är rund. Ett tjockt fettlager täcker bogen och höftregionen. Också benen och ansiktet har ett tydligt fettlager.

Vid konditionsklassificering uppskattas tjockleken på djurets underhudsfettlager.

Det är viktigt för djurets hälsa, dess produktions- och förökningsförmåga och i synnerhet för valpresultatet att konditionsklassen är den rätta och bibehålls under de olika tillväxt-, föröknings- och produktionsperioderna.


Djurens konditionsklass bedömdes enligt skalan 1-5, från ytterst mager (1) till mycket fet (5).

Konditionsklassificering behövs för att styra

- 1) utfodringen och konditionen fram till den första avelssäsongen för unga honor som valts till avel redan som valp
- 2) nedbantningen av feta honor som valts till avel sent på hösten
- 3) utfodringen och konditionen året runt för gamla avelsdjur
- 4) produktionsdjurens utfodring och kondition så att de inte blir för feta

I Sampo antecknas konditionsklassen i fältet Tilläggsinformation.

Figur 1. Rekommendation för storleken på den dagliga foderrationen g/dygn för unga blårevshonor som på förhösten valts ut till avel, då fodrets energisammansättning motsvarar FPF rf:s rekommendationer (1700 kcal/kg) eller ± 100 kcal.



Figur 2. Rekommendation för storleken på den dagliga foderrationen g/dygn för unga blårevshonor som på förhösten valts ut till avel, då fodrets energisammansättning motsvarar FPF rf:s rekommendationer (1200 kcal/kg) eller ± 100 kcal och då utfodringen av djuren begränsats under höstsäsongen.

